URZĄD MIASTA
LUBLIN
WYDZIAŁ PLANOWANIA

Dolina Bystrzycy rozdziela obszar miasta na dwie odrębne pod względem krajobrazowym części, zachodnią – wysoczyznę lessową oraz wschodnią – lekko falistą równinę. Zachodnią część miasta ukształtował proces akumulacji lessów oraz późniejsze procesy jej rozmywania. W rejonie Górek Czechowskich zdecydowanie przeważają równiny lessowe – formy pochodzenia eolicznego, z młodymi rozcięciami erozyjnymi i suchymi dolinami. Południową część Górek Czechowskich stanowi stok opadający w kierunku dna doliny rzeki Czechówki – terasy najniższej (1 – 3 m n.p. rzeki).

ZAŁ. NR 12

GEOMORFOLOGIA



REJON GÓREK CZECHOWSKICH

OZNACZENIA:

- GRANICA MIASTA
- GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO ZMIANĄ M.P.Z.P (PROCEDURA NIE ZAKOŃCZONA)
- GRANICA TERENU OBJĘTEGO PYTANIEM REFERENDALNYM

Formy pochodzenia lodowcowego
- Wysoczyzna morenowa falista

Formy pochodzenia eolicznego
- Wydmy
- Pokrywy pyłowe
- Równiny lessowe

Formy pochodzenia rzecznego (akumulacyjne i erozyjne)
- Doliny rzek i potoków stałych
- Dna dolin rzecznych tarasy najniższe 1-3 m n.p.rzeki
- Terasy akumulacyjne w dolinach rzecznych 5-15 m n.p.rzeki
- Terasy akumulacyjno-erozyjne w dolinach rzecznych 12-20 m n.p.rzeki
- a, b Krawędzie i stoki a.wysoczyzny,b. tarasów
- Młode rozcięcia erozyjne nierozdzielone
- Suche doliny
- Stoki
- Stożki napływowe

Formy pochodzenia denudacyjnego
- Równiny denudacyjne
- Ostańce denudacyjne
- Powierzchnie pedymentu
- Powierzchnie zrównań
- Zagłębienia bezodpływowe o różnej genezie
- Progi denudacyjne, częściowo o założeniach strukturalnych

Formy krasowe i sufozyjne
- Werteby i leje krasowe

Formy nieoznaczonej lub różnej genezy
- Równiny piaszczyste

Formy utworzone przez roślinność
- Równiny torfowe

Formy antropogeniczne
- Groble, wały przeciwpowodziowe i drogowe
- Nasypy

Źródło:Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski, arkusz Lublin,Bychawa, Niedrzwica, PIG Warszawa 1982; Harasimiuk M., Henkiel A.,

Opracowanie: J. BUTRYM